

Prevención

- Usa repelente en la piel expuesta.
- Coloca toldillos al dormir.
- Usa ropa que cubra brazos y piernas.
- Elimina criaderos de zancudos (agua estancada).
- Lava y tapa tanques de agua.

Personas con riesgo de presentar complicaciones



Menores de 1 año



Adultos mayores.



Personas con comorbilidades (HTA, diabetes, obesidad, TBC, VIH)



Embarazadas.

¿Qué hacer si sospecho que tengo Chikungunya?




Ante la presencia de cualquier síntoma sospechoso consultar inmediatamente en la IPS de atención básica.



No se automedique



Use repelente todos los días, ropa de manga larga, y toldillos.



En Fundación Avanzar FOS nos preocupamos por tu bienestar

Fuente : Minsalud - OPS

CHIKUNGUNYA

Más allá del dolor articular




FAFOS
Fundación Avanzar FOS

¿Qué es el Chikungunya?

Es una enfermedad viral que se propaga por la **picadura** de los mosquitos *Aedes aegypti* ó *Aedes Albopictus* infectados, que son los mismos vectores del Dengue.

La enfermedad generalmente dura entre 1 y 12 días.

Sintomatología



¿Los síntomas pueden persistir?

Si. Puede ocurrir reaparición de los síntomas 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad y algunas veces presentar síntomas reumáticos, aumento del dolor en articulaciones y huesos previamente lesionados. En algunos casos los síntomas pueden persistir hasta 2 o 3 años.



Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, informando al profesional de salud en la consulta sobre la sintomatología presentada e informando contacto con alguna persona enferma.

Tratamiento

Usualmente el tratamiento es ambulatorio con:

- Reposo en cama
- Uso de mosquitero.
- Para el dolor y la fiebre se recomienda tomar acetaminofén.
- Tomar líquidos en abundancia para evitar la deshidratación.

¿Me puede volver a dar Chikungunya?

No. Sólo una vez. Luego se desarrollan los anticuerpos que brindan inmunidad de por vida.



@pymavanzarfosmagisterio



PYM Avanzar Fos
Magisterio