



Contraindicación para la vacuna contra la fiebre amarilla

- Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, como linfomas, procesos neoplásicos o en terapia de larga evolución con corticoides, antineoplásicos o radioterapia, así como en personas con VIH.
- Alergia grave a la proteína del huevo.
- Reacción anafiláctica previa a la vacuna.
- Haber recibido vacunación para cólera o fiebre tifoidea en las tres semanas previas.
- Presencia de fiebre.
- Otra población como:



Gestantes



Adultos a partir de los 60 años



Mujer en lactancia hasta el año del bebe

Recomendaciones



El control de los mosquitos es un factor fundamental para la prevención en zonas urbanas al eliminar los potenciales criaderos.



El esquema de vacunación en Colombia tiene como objeto a la población de 18 meses de edad. Recuerda completar el esquema de vacunación de tus hijos para protegerlos contra la fiebre amarilla y otras enfermedades.



Recuerda que si vas a viajar a un municipios de alto riesgo para fiebre amarilla, se debe aplicar la vacuna. Esta se puede aplicar en cualquier IPS vacunadora.



Ante la presencia de cualquier síntoma sospechoso consultar inmediatamente en la IPS de atención básica.



En Fundación Avanzar FOS nos preocupamos por tu bienestar

Fuente : Minsalud



Vigilado **Supersalud**

TODOS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA




FAFOS
Fundación Avanzar FOS

¿Qué es la Fiebre Amarilla?

Es una enfermedad viral aguda, de carácter hemorrágica, prevenible por vacunación, sin tratamiento específico y transmitida únicamente por vectores mosquitos infectados de la familia Aedes (mismo transmisor de Dengue, Zika y chikunguña), Sabethes y Haemogogus

¿Cómo se transmite?

El virus de la fiebre amarilla es un arbovirus del género Flavivirus que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado que circula en dos ciclos principalmente, el selvático y el urbano:



Síntomas

El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Los síntomas suelen presentarse en 2 fases. La primera fase es la aguda cuyos síntomas desaparecen entre 3 a 4 días y se caracteriza por:



Fiebre



Dolor muscular



Dolor de cabeza



Escalofríos



Perdida de apetito



Nauseas o vómitos

Solo un pequeño porcentaje de pacientes entran en una segunda fase que es más tóxica, presentando síntomas como:

- Ictericia (color amarillo de la piel)
- Dolor abdominal con vómitos
- Deterioro de la función renal.
- Hemorragias bucales, nasales, oculares o gástricas, con aparición de sangre en los vómitos o las heces.

La mitad de los pacientes que entran en esta fase tóxica fallecen en un plazo de 10 a 14 días, mientras que la otra mitad se recupera sin daños orgánicos importantes.



FAFOS
Fundación Avanzar FOS

Tratamiento

No existe tratamiento específico para la fiebre amarilla, solo medidas de sostén para combatir la fiebre, la deshidratación y las infecciones asociadas.



Prevención

La vacunación es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. La vacuna es segura, gratuita y una sola dosis confiere protección de por vida a más del 90% de los vacunados en los 10 días siguientes a su administración.



@pymavanzarfosmagisterio



PYM Avanzar Fos
Magisterio

#FundaciónAvanzarFOS #ServiciosDeSaludDeCalidad